



# PROLACTOL P12



## ALIMENT COMPLEMENTAIRE DIETETIQUE pour vaches laitières

### OBJECTIF NUTRITIONNEL

Réduction du risque de fièvre vitulaire

### COMPOSITION

Chélate de magnésium, phosphate monopotassique anhydre, phosphate monocalcique, propylène glycol, glycérine, citrate trisodique.

### CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Protéine brute	2.3%
Matières grasses brutes	0.5%
Cendres brutes	11.2%
Cellulose brute	0.5%
Sodium	0.2%
Phosphore	1.9%
Calcium	7.5%
Magnésium	0.8%
Potassium	1.3%

### MODE D'EMPLOI

#### « Bien agiter avant emploi »

Distribuer le flacon lentement par voie orale. Bien tenir la tête de la vache en hauteur et s'assurer d'une bonne déglutition. Veiller à ce que la vache ait de l'eau à sa disposition.

#### PÉRIODE DU VÊLAGE

« 1 flacon de 500 ml de Prolactol P12

- La veille du vêlage
- Après le vêlage
- Le lendemain si nécessaire

**ATTENTION : ne pas administrer sur vache couchée.  
(une vache en crise perd son réflexe de déglutition)**

### AUTRES INDICATIONS

Une dose de 500 ml de PROLACTOL P12 apporte 47 g de calcium dont 43.5 g sous forme de formiate et 3.5 g sous forme de phosphate monocalcique.

**« Bien agiter avant emploi.  
Bien refermer après utilisation et à  
utiliser dans les 4 mois après  
ouverture. A stocker dans un local  
clos et tempéré ».**

La consultation d'un nutritionniste est recommandée avant utilisation..

### DLUO

24 mois

### CONDITIONNEMENTS

Présentation	Conditionnement	Palettisation
Flacon 500 ml	Carton de 6	32 x 6
Bidon 5 litres	Carton de 4	24 x 4

DIF'performance



expert en diététique animale

499 Rue des Valois  
PA des Marches de Bretagne  
85600 ST HILAIRE DE LOULAY  
[www.difagri.com](http://www.difagri.com)

A utiliser de préférence avant et n° de lot  
(voir sur étiquette de traçabilité)

Fabriqué par : α FR 85 224 002